

U heeft vandaag een Epi-Lasik behandeling ondergaan.

Neemt u de volgende **regels** in acht:

- Vandaag houdt u een rustdag.
- Een zonnebril geeft verlichting.
- Bij pijn 1 á 2 Paracetamol/ codeïne tbl. 1 tot 3x daags.
- Diazepam is een rustgever, innemen voor of direct na de behandeling en voor de nacht.
U ontvangt 2 tabletten bij de receptie voor de eerste nacht.
- Pijn wordt veroorzaakt door het laagje epitheel wat verwijderd is.

U kunt de komende 2 dagen het volgende ervaren:

- Uw ogen kunt u zeer moeilijk of niet openen.
- Uw ogen zullen veel tranen.
- U kunt veel pijn ervaren aan het oog.
- Uw oogleden kunnen gezwollen zijn.

Veel verlichting van de pijn geeft een ijskoude waslap op de ogen gedurende een aantal uren!

Ongeveer een half uur nadat u vertrokken bent uit de kliniek zal de pijn komen opzetten.

Krijgt u de ogen niet open, ga liggen en druppel op uw wimpers.

Nooit aan uw oogleden trekken om de ogen te openen.

De eerste controle afspraak zal zijn op:

Bij ernstige ongerustheid kunt u ons bereiken op:

Praktijk: 020-6401104

Medicatie overzicht:

Behandeldag + 1^e week:

- 2x daags 1 druppel **Dexamethason**. (bijv: om 20:00 en 8:00 uur = 12 uurs cyclus)
Druppels gebruiken t/m 14 dagen na de behandeling.
- 2x daags 1 druppel **Azyter**. (bijv: om 20:30 en 8:30 uur = 12 uurs cyclus)
Druppels gebruiken t/m 3 dagen na de behandeling.
- 3x daags streepje Vidisic carbogel in uw onderooglid.
(Dit dient om de ogen te koelen).

2^e week:

- 2x daags 1 druppel Dexamethason. (na 14 dagen stoppen)
- 4x daags 1 druppel Hylolasop.

3^e week:

- 1x daags 1 druppel Dicloabak.
- 4x daags 1 druppel Hylolasop (kunsttraan).

(**Let op:** een ½ uur tussen **druppels**, dit geldt ook voor **gel**.)

Doorgaan tot de 2^e controle, medicatie wordt dan opnieuw besproken.